

Achtung! Methylnmethcathinon!

Datum: August 2009

Neue Pillen!



Name	Spirale/ Rückseite ®	Roche 2
Gewicht	426.8 mg	448.0 mg
Durchmesser	8.2 mm	9.1 mm
Dicke	7.4 mm	5.4 mm
Bruchrille	ja	Ja / Kreuzbruchrille
Farbe	Grün-blau mit Sprengel	Weiss/ beige
Inhaltsstoff	156.0 mg Methylnmethcathinone (4-MMC) 15.4 mg Coffein	126.7 mg Methylnmethcathinone (4-MMC) 9.1 mg Coffein
Getestet in	Zürich August 2009	Zürich August 2009 (wurde auch schon in Holland getestet).



Name	Spirale/ Rückseite ®
Gewicht	242.8 mg
Durchmesser	8.2 mm
Dicke	4.5 mm
Bruchrille	ja
Farbe	Rot/rosa mit Sprengel
Inhaltsstoff	4.2 mg Methylnmethcathinone (4-MMC) 104.6 mg MDMA Coffein (nur qual)
Getestet in	Zürich August 2009

Infos zu Methylnmethcathinon

Substanz: Methylnmethcathinon/ 4-MMC ist auch als Mephedrone bekannt, es handelt sich dabei um ein Research Chemical, über welches noch keine wissenschaftlichen Fakten zu Risiken und Nebenwirkungen erhältlich sind. Die folgenden Infos basieren hauptsächlich aus Userinfos (Dank an eve+rave.ch und erowid.org!).

Wirkung: Stimulans/Emphathogen, starke Euphorie, starker Rededrang, klares Denken, Verbundenheitsgefühl mit anderen Menschen, erhöhte Leistungsfähigkeit, veränderte Sinneswahrnehmungen.

Risiken und Nebenwirkungen: starke Erhöhung des Blutdruckes, Herzrasen, Hyperaktivität, unangenehmes Kältegefühl, unangenehmes Gefühl in der Herzgegend, Craving – starker Drang nach zu legen. Der Konsum von Mephedrone kann Durchblutungsstörungen hervorrufen, diese können zu blauen Ellbogen, Knie und Lippen führen!

Achtung! Methylnmethcathinon!

Langfristiger und häufiger Konsum: Verschlechterung von Konzentration und Gedächtnis, rasche psychische Abhängigkeit. Nach dem Konsum von Mephedrone ist ein starkes Craving festzustellen. Deshalb besteht die Gefahr, dass hohe Dosen innerhalb einer Nacht konsumiert werden, diese können Wahnvorstellungen und/oder Paranoia hervorrufen. Mephedrone hat ein starkes Abhängigkeitspotential, mit psychischen Symptomen.

Laut Zeitungsberichten scheint der Konsum von Mephedrone in Europa schon zu Todesfällen geführt zu haben. Ob dabei noch andere Substanzen einen Einfluss hatten entzieht sich unserer Kenntnis!

Safer Use Regel!

- Pille analysieren lassen!
- Antesten = 1/2 Pille nehmen 2 Stunden warten und schauen wie sie wirkt!
- Bei Verdacht auf 4-MMC nie nachspicken!

Quellen: eve+rave.ch, erowid.org, wikipedia