

Achtung! verkauft als Ecstasy!

Datum: Januar 2011

Neue Pillen!

Name	Herz
Gewicht	200.0 mg
Durchmesser	7.1 mm
Dicke	5.1 mm
Bruchrille	nein
Farbe	beige/braun
Inhaltsstoff	Amphetamin 0.1 mg Coffein 0.6mg Lidocain nur qual.
Getestet in	Zürich, Januar 2011



Risikoeinschätzung

Diese als XTC verkaufte Tablette beinhaltet drei aktive Substanzen. Amphetamin und Coffein sind sehr tief dosiert, weshalb sich kaum eine Wirkung einstellen wird. Lidocain wurde nur qualitativ analysiert und ist vermutlich der Hauptbestandteil dieser Pille. Über Wirkung und Nebenwirkung dieser Substanzkombination gibt es keine Infos. Deshalb ist vom Konsum dieser Pille abzuraten!

Infos Amphetamin

Substanz

Amphetamin wird meistens gemischt mit Koffein als Speed verkauft.

Erscheinungsformen: Weisses, beiges oder rosafarbenes Pulver, selten in Pillenform.

Konsumformen: Amphetamin wird geschluckt, geschnupft, seltener geraucht oder gespritzt

Dosierung: 5 - 25 mg

Wirkung

Wirkungseintritt: Geschnupft nach ca. 2 - 10 Minuten, geschluckt nach 30 - 45 Minuten.

Wirkungsdauer: 6 - 12 Stunden (Amphetamin ist im Körper lang bioaktiv)

Risiken und Nebenwirkungen

Kurzzeitnebenwirkungen sind verspannter Kiefer, Mundtrockenheit, Temperaturanstieg, grosser Flüssigkeitsverlust und erhöhte Herzfrequenz sowie erhöhter Blutdruck und Zittern am ganzen Körper, Reizbarkeit und aggressives Verhalten (vor allem in Kombination mit Alkohol). Ab einer Dosis von 25 mg Amphetamin verstärken sich diese negativen Effekte.

Chronischer Konsum von Amphetamin kann zu psychischer Abhängigkeit, einer Amphetaminpsychose und/oder körperlichen Mangelerscheinungen führen.

Amphetamin + Koffein

Die Kombination beider Substanzen verstärkt die Wirkung. Dies führt zu einer höheren Belastung für das Herz-Kreislauf System. Es besteht zudem eine erhöhte Gefahr des Austrocknens, da Koffein dem Körper zusätzlich Wasser entzieht.

Lidocain

ist ein Lokalanästhetika. Wie alle örtlichen Betäubungsmittel kann Lidocain die typischen Nebenwirkungen erzeugen; dazu gehören Wirkungen im Bereich des zentralen Nervensystems (wie z. B. Unruhe, Krampfanfälle u. a.), des Herzens (Rhythmusstörungen), Blutdruckabfall und allergische Reaktionen.

Safer Use Regeln

- Antesten = 1/2 Pille nehmen 2 Stunden warten und schauen wie sie wirkt!
- Bei Verdacht auf unbekannte Substanzen nie nachspicken!
- Bei ausbleibender Wirkung 2 Stunden warten und nicht gleich nachspicken!

www.saferparty.ch ein Angebot von Streetwork Zürich + Partner von www.safer-clubbing.ch