

XTC mit MDEA und Coffein

Datum: Dezember 2011 **Neue Pille!**

| | |
|--------------|---|
| Name | Kreuz |
| Gewicht | 283.4 mg |
| Durchmesser | 9.0 mm |
| Dicke | 3.9 mm |
| Bruchrille | Nein |
| Bemerkungen | - |
| Farbe | rot gesprenkelt |
| Inhaltsstoff | MDEA 112.8 mg Coffein 121.1 mg |
| Getestet in | Zürich, Dez. 2011 |



Risikoeinschätzung

Die Wirkung ist vergleichbar mit der von Ecstasy, ohne einfühlende Wirkung und weniger euphorisierend, dafür berauschender; man fühlt sich eher "breit" oder „gestoned“. Bei hohen Dosen sind Halluzinationen möglich (MDEA wird im Körper zu MDA). Über Langzeitwirkungen von MDEA ist nichts bekannt. Die Kombination mit einer grossen Menge Coffein verstärkt vermutlich die Wirkung und dehydriert zusätzlich.

Substanz

MDEA (3,4-Methylendioxyethylamphetamin), ist ein synthetisches Amphetaminderivat, das selten zusammen mit MDMA in Ecstasy vorkommt.
Dosierung: 1,3 mg pro kg Körpergewicht (1,3 mg x 80 kg = 100 mg)

Risiken und Nebenwirkungen

Übelkeit bis Brechreiz, Mundtrockenheit, Verkrampfung der Kiefermuskulatur, Schweissausbrüche, Koordinationsstörungen, Zittern, Schlafstörungen.

Safer Use Regeln

- Falls du keine Möglichkeit hast Substanzen analysieren zu lassen, teste immer eine halbe Pille an, warte nach der Einnahme 2 Stunden und schaue wie die Wirkung ist.
- Überlege dir gut, ob es wirklich nötig ist nachzulegen.
- Denke daran: trinke alkoholfreie Getränke, mache von Zeit zu Zeit Pause an der frischen Luft und vergiss nicht jede Party hat einmal ein Ende.