

Achtung! verkauft als Ecstasy!

Datum: April 2010 **Neue Pillen!**



Name	Herz	Stier
Gewicht	187.6 mg	252.0 mg
Durchmesser	7.1 mm	9.4 mm
Dicke	4.1 mm	3.6 mm
Bruchrille	Nein	Nein
Farbe	Rot	hellrosa
Inhaltsstoff	9.3 mg Koffein 16.1 mg m-CPP 16.8 mg Domperidon	23.0 mg m-CPP 5.0 mg Amphetamin <0.1% Coffein
Getestet in	Roggwil März + Zürich Juni / Sept./Nov./Dez.09	Zürich, April 2010

Infos zu m-CPP

Substanz: m-CPP (Meta-Chlorphenyl-Piperazin = 1-(3-Chlorphenyl)-Piperazin) ist ein Piperazinderivat in Pulverform. Wird meist als XTC in Pillenform verkauft. Konsumform: geschluckt. Therapeutische Dosis: ca. 50 mg. Die Substanz m-CPP ist ein Metabolit des nicht trizyklischen Antidepressivums Trazodon.

Wirkung: Eine schwache wahrnehmungsverändernde Wirkung (nach 1 – 2 Stunden) und leichte Glücksgefühle können sich einstellen. Die Wirkdauer beträgt 4 – 8 Stunden. m-CPP hat keine leistungssteigernde Wirkung, Herzschlag und Puls sind nicht erhöht.

Risiken – Nebenwirkungen: Die Panik und Angst induzierende Wirkung von m-CPP, einem Serotoninrezeptor-Agonist, ist medizinisch gut dokumentiert. Risiken und Nebenwirkungen treten meist stärker zum Vorschein als die Wahrnehmung verändernde Wirkung: Kopfschmerzen, Müdigkeit, Schwindelgefühl, Verwirrtheit, Ängstlichkeit, Zittern, Nervosität, Schweratmigkeit und Übelkeit bis hin zum Erbrechen.

Nach dem Konsum oft mehrere Tage lang starke Niedergeschlagenheit und depressive Verstimmung. Achtung: Mischkonsum zusammen mit MDMA (Ecstasy) kann zu Krampfanfällen führen! Nach dem Konsum von m-CPP kann sich der Urin für 2-3 Tage rostbraun bis rötlich verfärben. Regelmässiger Konsum kann zu Depressionen, Angstzustände, psychomotorische Unruhe, sowie sexuellen Funktionsstörungen führen.

Infos zur Mischung m-CPP+Koffein

Neben den zuvor beschriebenen Wirkungen und Nebenwirkungen von m-CPP birgt diese Mischung ein zusätzliches Risiko in Bezug auf Dehydration (Austrocknung). Dieses Risiko erhöht sich, wenn mehrere dieser Pillen innerhalb einer Nacht konsumiert werden. Die analysierten Mengen an Koffein rufen keinen leistungssteigernden Effekt hervor.

www.saferparty.ch ein Angebot von Streetwork Zürich + Partner von www.safer-clubbing.ch

Achtung! verkauft als Ecstasy!

Infos zur Mischung m-CPP+Amphetamin

Die analysierte Menge Amphetamin wird keinen leistungssteigernden Effekt hervor rufen. Wie bei Koffein birgt diese Mischung ein zusätzliches Risiko in Bezug auf Dehydratation (Austrocknung). Dieses Risiko erhöht sich, wenn mehrere dieser Pillen innerhalb einer Nacht konsumiert werden.

Infos zu Domperidon

Domperidon ist ein Arzneimittel, welches zur Behandlung und Vorbeugung von Erbrechen und Übelkeit Anwendung findet (Antiemetikum). Es gehört zur Gruppe der Dopamin-Antagonisten. Da Domperidon die Blut-Hirn-Schranke kaum überwinden kann, hat es keinen Einfluss auf das zentrale Nervensystem = keine psychoaktive Wirkung. Eine wichtige Nebenwirkung von Domperidon ist, neben Durchfall, eine Erhöhung des Prolaktinspiegels (körpereigenes Hormon), die zu nachlassender Libido, Menstruationsstörungen und Impotenz führen kann. In Kombination mit Medikamenten der Gruppe der HIV-Proteinase-Hemmer und der dualserotonergen Antidepressiva (DAS, Bsp. Nefazodon) führt der Konsum von Domperidon zu einem erhöhten Dopamin Anstieg. Dieser Anstieg kann zu einer Tachyarrhythmie (Herzrhythmusstörungen) und schnellem Herzschlag führen.

Die maximale Dosis wird mit 80mg/Tag für erwachsene Personen angegeben!

Die Wechselwirkung zwischen m-CPP, Coffein, Amphetamin und Domperidon sind unerforscht!

Safer Use Regeln

- Antesten = 1/2 Pille nehmen 2 Stunden warten und schauen wie sie wirkt!
- Bei Verdacht auf m-CPP nie nachspicken, man weiss nicht, welche Nebenwirkungen hohe Dosen m-CPP hervor rufen können.
- Vor dem Konsum von m-CPP ist abzuraten!

Quellen: Erowid.com, Wikipedia, know-drugs.ch, Arzneimittel Kompendium, EMCCDA

www.saferparty.ch ein Angebot von Streetwork Zürich + Partner von www.safer-clubbing.ch