

Warnung: Methadon Tablette



Name	Methadon / kein logo
Gewicht	181.2 mg
Durchmesser	9.1 mm
Dicke	2.2 mm
Bruchrille	Ja
Farbe	weiss
Inhaltsstoff	Methadon
Getestet in	Zürich, Mai 2010

Diese Tablette wurde als Ecstasy verkauft, enthält aber Methadon! Für Opiat-ungewohnte Personen kann Methadon tödlich sein!

Methadon ist ein vollsynthetisch hergestelltes Opioid mit starker schmerzstillender Wirksamkeit. Methadon wurde in der Öffentlichkeit bekannt als Opiatersatzstoff durch seine breite Anwendung im Rahmen von Heroin-Substitutionsprogrammen.

Wirkung

Methadon wirkt ähnlich wie andere Opiate, z.B. Heroin oder Codein; Schmerzlindernd, ausgleichend-beruhigend, angstlösend. Der euphorische "Flash" des Heroins fehlt.

Nach der Einnahme dauert es ca. 1/2 Stunde bis zum Wirkungseintritt. Nach ungefähr 4 Stunden ist der Wirkungshöhepunkt erreicht und die mittlere Wirkungsdauer liegt bei 25 Stunden, weshalb Methadon auch zur Substitution eingesetzt wird. Regelmässiger Methadonkonsum führt zu Abhängigkeit mit körperlichen Symptomen!

Risiken und Nebenwirkungen

Bis zur Größe eines Stecknadelkopfes verengte Pupillen, schwere Atemdepression, starker Blutdruckabfall, Herzrhythmusstörungen, Hyperthermie, Bewusstseinsstörungen bis zum Koma und dem Tod durch Ersticken. Bei Personen welche Opiate nicht gewöhnt sind, kann der Konsum von Methadon schon in geringen Mengen lebensgefährlich sein. Opiat-Überdosierungen können bei rascher medizinischer Intervention behandelt werden.

Die gleichzeitige Anwendung von Zentralnervensystem-dämpfenden Substanzen (Alkohol, Antidepressiva, GHB/GBL, Barbiturate, Benzodiazepine) verstärkt die Nebenwirkungen von Methadon!

Merkmale einer Überdosierung

Starke Übelkeit (v.a. bei Opiat-ungewohnten Personen) Stecknadelpupillen; Schläfrigkeit; kalte, feuchte Haut; Blutdruckabfall – im schlimmsten Fall Bewusstlosigkeit und Atemstillstand – **Person unbedingt in ärztliche Behandlung geben!**

www.saferparty.ch ein Angebot von Streetwork Zürich + Partner von www.safer-clubbing.ch