

# XTC Pillen mit Butylone

Neue Pillen August 2011

Name	<b>VW</b>
Gewicht	284.6 mg
Durchmesser	8.1 mm
Dicke	4.8 mm
Bruchrille	Ja
Farbe	weiss
Inhaltsstoff	<b>87.2 mg MDMA</b> <b>33.5 mg Butylone</b>
Getestet in	Zürich, August 2011



## Risikoeinschätzung

**MDMA+Butylone:** Die Pille enthält eine hohe Dosis MDMA und zusätzlich noch das Entaktogen Butylone (bk-MDBD). Butylone ist ein praktisch unerforschtes Research Chemical. Somit ist über die Wirkung, die Nebenwirkungen und Langzeitfolgen dieser Substanz wenig bekannt. Dies gilt auch für die Mischung von MDMA und Butylone. Da sich Butylone und Methylone (bk-MDMA) ähnlich verhalten ist damit zu rechnen, dass der Mischkonsum von MDMA und Methylone Krämpfe hervorrufen kann. Aufgrund des niedrigen Informationsstands nimmt der Konsument die Rolle eines Versuchskaninchens ein, wenn er diese Tablette konsumiert.

## Infos zu Butylone ( $\beta$ -keto-N-methylbenzodioxolylpropylamine)

**Dosierung:** unbekannt **Wirkungseintritt und –Dauer:** nach ca. 90 Min! Wirkdauer ist unbekannt wird aber länger als MDMA angegeben.

**Wirkung:** Butylone wirkt Stimulierend und Entaktogen und somit ähnlich wie MDMA. Gemäss Erfahrungsberichten ist die Wirkung weniger stabil und tritt in Wellenbewegungen auf, was als unangenehm empfunden wird.

**Nebenwirkungen:** Herzrasen, Druckkopfschmerzen, Bluthochdruck, erhöhte Belastung für den Herzkreislauf, Kieferkrämpfe. Das Runterkommen wird als unangenehm empfunden!

## Infos zu MDMA

**Dosierung:** max. 1,5 mg MDMA pro kg Körpergewicht für Männer, max. 1,3 mg pro kg Körpergewicht für Frauen. **Wirkungseintritt und –Dauer:** nach ca. 30 Min. / 4-6 Std.

**Wirkung:** MDMA bewirkt eine vermehrte Freisetzung des Neurotransmitters Serotonin. Hunger- und Durstgefühl sind reduziert, Wachheit und Aufmerksamkeit erhöht, Körpertemperatur und Blutdruck steigen an. Auf MDMA fühlst du dich leicht und unbeschwert, ein wohliges Körpergefühl breitet sich aus. Seh- und Hörvermögen verändern sich, Berührungen und Musik werden intensiver empfunden, Hemmungen werden abgebaut und das Kontaktbedürfnis wird gesteigert.

**Nebenwirkungen:** Kieferkrämpfe, Muskelzittern, Übelkeit/Brechreiz und erhöhter Blutdruck. Herz, Leber und Nieren werden besonders stark belastet. Es besteht auch die Gefahr eines Hitzschlags, da die Körpertemperatur erhöht wird.

## Safer Use Regeln

- Falls du keine Möglichkeit hast Substanzen analysieren zu lassen, teste immer eine halbe Pille an, warte nach der Einnahme 2 Stunden und schaue wie die Wirkung ist.
- Überlege dir gut, ob es wirklich nötig ist nachzulegen.
- Denke daran: trinke alkoholfreie Getränke, mache von Zeit zu Zeit Pause an der frischen Luft und vergiss nicht jede Party hat einmal ein Ende.

www.saferparty.ch ein Angebot von Streetwork Zürich + Partner von www.safer-clubbing.ch