

Achtung! verkauft als Ecstasy!

Datum: September **NeuePillen!**



Name	Delphin	Delphin	Delphin
Gewicht	362.84 mg	391.88 mg	358.7 mg
Durchmesser	9.35 mm	9.41 mm	9.4 mm
Dicke	4.34 mm	4.27 mm	4.3mm
Bruchrille	Keine	Keine	Keine
Bemerkungen	Nicht homogene Tablette, Inhaltsstoff können variieren	Nicht homogene Tablette, Inhaltsstoff können variieren	
Farbe	Weiss, mit rosa Sprengel	Weiss, mit rosa Sprengel	Weiss, mit rosa Sprengel
Inhaltsstoff	m-CPP 8.13 mg MDMA 13.6 mg	m-CPP 14.04 mg MDMA 14.10 mg Amphetamin 1.9 mg	m-CPP 9.3 mg MDMA 120 mg Amphetamin 1.9 mg
Getestet in	Zürich, August 2011	Zürich, August 2011	Zürich, Sept. 2011

Risikoeinschätzung

Diese als XTC verkauften Pillen enthalten neben MDMA, noch das Piperazin m-CPP und eine kleine Menge Amphetamin. m-CPP ruft bei manchen Personen ein MDMA-ähnliche Wirkung hervor (eher halluzinogen, weniger entaktogen), bei vielen Personen stellen sich aber nur die unten beschriebenen Nebenwirkungen ein. Obwohl sich MDMA in diesen Tabletten befindet wird sich in dieser Menge keine MDMA-typische Wirkung entfalten. Es besteht somit die Gefahr, dass nachgespickt wird und somit hohe Mengen m-CPP eingenommen werden. **Die Wechselwirkung zwischen m-CPP, MDMA und Amphetamin sind gänzlich unerforscht! Die Mischung zwischen MDMA und m-CPP kann zu Krampfanfällen führen.**

Infos zu m-CPP

Substanz: m-CPP (Meta-Chlorphenyl-Piperazin = 1-(3-Chlorphenyl)-Piperazin) ist ein Piperazinderivat in Pulverform. Wird meist als XTC in Pillenform verkauft. Konsumform: geschluckt.

Wirkung: Eine schwache wahrnehmungsverändernde Wirkung (nach 1 – 2 Stunden) und leichte Glücksgefühle können sich einstellen. Die Wirkdauer beträgt 4 – 8 Stunden. m-CPP hat keine leistungs-steigernde Wirkung, Herzschlag und Puls sind nicht erhöht.

Risiken – Nebenwirkungen: Risiken und Nebenwirkungen treten meist stärker zum Vorschein als die wahrnehmungsverändernde Wirkung: Kopfschmerzen, Müdigkeit, Schwindelgefühl, Verwirrtheit, Ängstlichkeit, Zittern, Nervosität, Schweratmigkeit und Übelkeit bis hin zum Erbrechen. Nach dem Konsum oft mehrere Tage lang starke Niedergeschlagenheit und depressive Verstimmung. Nach dem Konsum von m-CPP kann sich der Urin für 2-3 Tage rostbraun bis rötlich verfärben. Regelmässiger Konsum kann zu Depressionen, Angstzustände, psychomotorische Unruhe, sowie sexuellen Funktionsstörungen führen.

www.saferparty.ch ein Angebot von Streetwork Zürich + Partner von www.safer-clubbing.ch

Achtung! verkauft als Ecstasy!

Infos zu MDMA

Wirkung: MDMA bewirkt eine vermehrte Freisetzung des Neurotransmitters Serotonin. Hunger- und Durstgefühl sind reduziert, Wachheit und Aufmerksamkeit erhöht, Körpertemperatur und Blutdruck steigen an. Auf MDMA fühlst du dich leicht und unbeschwert, ein wohliges Körpergefühl breitet sich aus. Seh- und Hörvermögen verändern sich, Berührungen und Musik werden intensiver empfunden, Hemmungen werden abgebaut und das Kontaktbedürfnis wird gesteigert.

Nebenwirkungen: Kiefernahlen, Muskelzittern, Übelkeit/Brechreiz und erhöhter Blutdruck. Herz, Leber und Nieren werden besonders stark belastet. Es besteht auch die Gefahr eines Hitzschlags, da die Körpertemperatur erhöht wird.

Infos zu Amphetamin

Wirkung: Freisetzung der körpereigenen Leistungsdroge Noradrenalin, Steigerung des Selbstwertgefühls durch die gleichzeitige Ausschüttung von Dopamin. Erhöhung der Körpertemperatur, Unterdrückung von Hunger und Schlafbedürfnisses, Gefühl erhöhter Leistungsfähigkeit, erhöhte Risikobereitschaft, unterdrücktes Schmerzempfinden, Euphorie und gesteigerter Rededrang (Laberflash).

Risiken und Nebenwirkungen: Kurzzeitnebenwirkungen sind verspannter Kiefer, Mundtrockenheit, Temperaturanstieg, grosser Flüssigkeitsverlust und erhöhte Herzfrequenz sowie erhöhter Blutdruck und Zittern am ganzen Körper, Reizbarkeit und aggressives Verhalten (vor allem in Kombination mit Alkohol). Ab einer Dosis von 25 mg Amphetamin verstärken sich diese negativen Effekte.

Safer Use Regeln

- Bei Verdacht auf unbekannte Substanzen nie nachspicken!
- MDMA nicht höher als 1.5 mg pro Kg Körpergewicht dosieren !
- Bei ausbleibender Wirkung 2 Stunden warten und nicht gleich nachspicken!
- Antesten = 1/2 Pille nehmen 2 Stunden warten und schauen wie sie wirkt!