

Achtung! verkauft als Ecstasy!

Datum: März 2011 **Neue Pillen!**



Name	Asiatisches Schriftzeichen/Fisch	Motorolla	Asiatisches Schriftzeichen/Fisch
Gewicht	241.3 mg	227.4 mg	233.5 mg
Durchmesser	7.1 mm	8.2 mm	7.1 mm
Dicke	4.6 mm	3.7 mm	4.5 mm
Bruchrille	keine	ja	keine
Bemerkungen	Logo auf beiden Seiten		Logo auf beiden Seiten
Farbe	rot	beige	rot
Inhaltsstoff	m-CPP 44.6 mg	m-CPP 51.9 mg	m-CPP 37.4 mg
Getestet in	Zürich, Februar 2011	Zürich, März 2011	Zürich, April 2011

Risikoeinschätzung

Diese als XTC verkaufte Pille enthält kein MDMA, sondern eine hohe Dosis des Piperazins m-CPP. m-CPP ruft bei manchen Personen ein MDMA-ähnliche Wirkung hervor (eher halluzinogen, weniger entaktogen), bei vielen Personen stellen sich aber nur die unten beschriebenen Nebenwirkungen ein. Es besteht die Gefahr, dass bei ausbleiben der MDMA-typischen Wirkung nachgespickt wird und somit hohe Mengen m-CPP eingenommen werden.

Infos zu m-CPP

Substanz: m-CPP (Meta-Chlorphenyl-Piperazin = 1-(3-Chlorphenyl)-Piperazin) ist ein Piperazinderivat in Pulverform. Wird meist als XTC in Pillenform verkauft.

Konsumform: geschluckt.

Wirkung: Eine schwache wahrnehmungsverändernde Wirkung (nach 1 – 2 Stunden) und leichte Glücksgefühle können sich einstellen. Die Wirkdauer beträgt 4 – 8 Stunden. m-CPP hat keine leistungs-steigernde Wirkung, Herzschlag und Puls sind nicht erhöht.

Risiken – Nebenwirkungen: Risiken und Nebenwirkungen treten meist stärker zum Vorschein als die wahrnehmungsverändernde Wirkung: Kopfschmerzen, Müdigkeit, Schwindelgefühl, Verwirrtheit, Ängstlichkeit, Zittern, Nervosität, Schweratmigkeit und Übelkeit bis hin zum Erbrechen. Nach dem Konsum oft mehrere Tage lang starke Niedergeschlagenheit und depressive Verstimmung. Achtung: Mischkonsum zusammen mit MDMA (XTC) kann zu Krampfanfällen führen! Nach dem Konsum von m-CPP kann sich der Urin für 2-3 Tage rostbraun bis rötlich verfärben. Regelmässiger Konsum kann zu Depressionen, Angstzustände, psychomotorische Unruhe, sowie sexuellen Funktionsstörungen führen.

Safer Use Regeln

- Antesten = 1/2 Pille nehmen 2 Stunden warten und schauen wie sie wirkt!
- Bei Verdacht auf unbekannte Substanzen nie nachspicken!
- Bei ausbleibender Wirkung 2 Stunden warten und nicht gleich nachspicken!

www.saferparty.ch ein Angebot von Streetwork Zürich + Partner von www.safer-clubbing.ch