

Warnung: XTC Pille mit 2C-P

Neue Pillen: **September 2013**

Name	Mc Donald
Gewicht	215.8 mg
Durchmesser	8.2 mm
Dicke	4.1 mm
Bruchrille	Nein
Bemerkungen	-
Farbe	Gelb
Inhaltsstoff	2C-P: ca. 6mg
Getestet in	Zürich, September 2013



Risikoeinschätzung 2C-P haltige XTC Tablette

Die Einnahme dieser Pille erzeugt keine MDMA typische Wirkung. 2C-P ist eine potente psychedelische Substanz, welche stärker wirkt als das bekannte 2C-B. Aufgrund des langandauernden Wirkungseintritts (bis zu 3 Stunden) besteht die Gefahr, dass nachdosiert und somit ungewollt eine hohe Menge an 2C-P eingenommen wird. Halluzinogen-unerfahrene Personen sollten auf den Konsum dieser Pille verzichten. 2C-P wurde zum ersten Mal als Bestandteil einer als XTC verkauften Pille analysiert.

Infos zu 2C-P

2C-P ist ein psychedelisches 2C-Derivat und charakterisiert sich vor allem durch dessen lange Wirkung, sowie dessen starke Halluzinationen.

Dosierung: 6-10mg. Bedenke, dass bereits ein Milligramm mehr oder weniger die „richtige“ Menge verfehlen kann und das Risiko zu Nebenwirkungen erhöht wird.

Wirkungseintritt: 2-3 Stunden, bis sich die volle Wirkung entfaltet, die dann schlagartig eintrifft.

Wirkungsdauer: 10-16h, bei höheren Dosen auch länger (>10mg).

Wirkung: 2C-P verursacht starke Halluzinationen, sowohl bei geöffneten als auch bei geschlossenen Augen. Oft nimmt man dabei geometrische Muster wahr oder sieht, wie sich die Umgebung verändert (morphen). Man kann aber auch konkrete Objekte sehen. Es kann zu einer Körper-Geist-Trennung, Euphorie, Visionen und gesteigerten Sinneswahrnehmungen kommen. Die Wirkungsintensität variiert individuell sehr. Es ist deshalb möglich, dass aufgrund eines unterschiedlichen Metabolismus, einige Konsumierende stärker auf dieselbe Dosis reagieren als andere. 2C-P wirkt auch leicht stimulierend und empathogen.

Nebenwirkungen: Zittern, Schwitzen, geweitete Pupillen, Verwirrtheit, Husten und Belastung des Herz-Kreislaufsystems. Das Risiko, einen Horrortrip zu erleben, ist gegeben, vor allem bei höheren Dosen und wenn 2C-P nicht in einem geschützten Setting konsumiert wird. Bei psychischen Problemen soll aufgrund des Risikos, eine Psychose zu erleben, auf den Konsum von Halluzinogenen verzichtet werden.

Safer Use Regeln

- Falls du keine Möglichkeit hast, Substanzen analysieren zu lassen, taste dich sehr vorsichtig an die optimale Dosis heran und warte mindestens 3 Stunden ab und erfahre die Wirkung.
- Überlege dir gut, ob es wirklich nötig ist nachzulegen.
- Denk daran: Trink alkoholfreie Getränke, mach von Zeit zu Zeit Pause an der frischen Luft und vergiss nicht: Jede Party hat einmal ein Ende.

