

Info: XTC Pille mit Coffein und MDMA

Neue Pillen: **Juli 2013**

Name	Rolling Stone
Gewicht	268.3 mg
Durchmesser	8.1 mm
Dicke	5.2 mm
Bruchrille	Nein
Bemerkungen	Logo nur schwach erkennbar
Farbe	Türkis mit dunkeln Sprengel
Inhaltsstoff	Coffein 6.7 mg MDMA 108.5 mg
Getestet in	Zürich, Juli 2013



Risikoeinschätzung

XTC mit Coffein und MDMA kann Euphorie auslösen, dehydriert (trocknet aus), löst Unruhe aus und Kopfschmerzen hervorrufen. Tasse starker Kaffee ca. 80mg Koffein.

Infos zu Koffein

Wirkungseintritt und -dauer: nach 10-60 Min./2-3 Stunden

Wirkung: Koffein macht wach, beschleunigt den Herzschlag und steigert vorübergehend die geistige Leistungsfähigkeit. In höheren Dosen (ca. 300-600 mg = ca. 8 Tassen Kaffee) erzeugt es Euphorie. **Nebenwirkungen:** Koffein entzieht dem Körper Flüssigkeit (Dehydration). Bei sehr hohen Dosen: Schweissausbrüche, Herzflattern, Harndrang, Herzrhythmusstörungen, starke Wahrnehmungsstörungen, Zittern, Nervosität und Schlafstörungen. Bei dauerhaftem, regelmässigem und hochdosiertem Koffeinkonsum besteht die Gefahr einer Abhängigkeit mit körperlichen Symptomen. Mögliche Entzugssymptome: Kopfschmerzen, Nervosität, Müdigkeit, Erbrechen bis hin zu Bewegungs- und Konzentrationsstörungen.

Infos zu MDMA*HCl

Dosierung: max. 1.5 mg MDMA pro kg Körpergewicht für Männer, max. (1.3 mg Frauen).

Wirkungseintritt und –Dauer: nach ca. 30 Min. / 4-6 Std.

Wirkung: MDMA bewirkt eine vermehrte Freisetzung des Neurotransmitters Serotonin. Hunger- und Durstgefühle sind reduziert, Wachheit und Aufmerksamkeit erhöht, Körpertemperatur und Blutdruck steigen an. Es stellt sich ein leichtes, unbeschwertes und wohliges Körpergefühl aus. Seh- und Hörvermögen verändern sich, Berührungen und Musik werden intensiver empfunden, Hemmungen werden abgebaut und das Kontaktbedürfnis wird gesteigert. **Nebenwirkungen:** „Kiefer mahlen“, Muskelzittern, Übelkeit, Brechreiz und erhöhter Blutdruck. Herz, Leber und Nieren werden besonders stark belastet. Die Körpertemperatur wird erhöht.

Safer Use Regeln

- Falls du keine Möglichkeit hast Substanzen analysieren zu lassen, teste immer eine halbe Pille an, warte nach der Einnahme 2 Stunden und schaue wie die Wirkung ist.
- Überlege dir gut, ob es wirklich nötig ist nachzulegen.
- Denke daran: trinke alkoholfreie Getränke, mache von Zeit zu Zeit Pause an der frischen Luft und vergiss nicht jede Party hat einmal ein Ende.

