

Warnung: verkauft als XTC

Datum: Juni 2014



Name	„thumbs up" fb likes
Gewicht	593.5 mg
Durchmesser	ca. 9 mm
Dicke	ca. 8 mm
Bruchrille	Ja
Farbe	Schwarz
Inhaltsstoff	4-Fluorphenylpiperazin (pFPP): qual. 4-Methoxyphenylpiperazin (pMeOPP): qual.
Bemerkungen	Schwer, zerbröselnd und färbt schwarz ab
Getestet in	Zürich, Juni 2014

Risikoeinschätzung

Diese Pille enthält ein Gemisch aus zurzeit nicht vollständig zuweisbaren Regioisomeren, bestehend aus einem oder mehreren Fluorphenylpiperazin(en) und Methoxyphenylpiperazin(en). Vermutlich handelt es sich um ein Gemisch bestehend aus 4-Fluorphenylpiperazin (pFPP) und 4-Methoxyphenylpiperazin (pMeOPP). Die Konsistenz war leicht klebrig wachsig, fast wie ein relativ trockener aber weicher Hasch, es sind auch kleine Kriställchen ersichtlich.

Es ist unklar, inwieweit diese Pille im Umlauf ist und als was sie verkauft wird! Es ist vom Konsum dieser Tablette aufgrund der unbekanntenen Inhaltsstoffe dringend abzuraten!

Piperazine

Die Annahme, dass Piperazinderivate aus der Pfefferpflanze extrahiert werden, entstammt wahrscheinlich einer Verwechslung mit der nicht verwandten Substanz Piperin, einem Bestandteil des schwarzen Pfeffers (*Piper nigrum*). Piperazine sind synthetische Substanzen. Piperazin wird u. a. als Ausgangsprodukt zur Herstellung von Kunststoffen verwendet. Die bekanntesten psychoaktiven Piperazinderivate sind Benzylpiperazin (BZP), Trifluormethylphenylpiperazin (TFMPP) oder meta-Chlorphenylpiperazin (mCPP). Piperazin findet sich außerdem als Baustein in einer ganzen Reihe von wichtigen Arzneistoffen, z.B. Trazodon (Antidepressiva), Sildenafil (Viagra) oder Hydroxyzin (Antihistaminikum – gegen Heuschnupfen). Die Symptome einer Überdosierung von Piperazinen zeigen sich vor allem durch das Auftreten neurotoxischer Nebenwirkungen (Tremor, Ataxie, Krämpfe, Paresen) sowie gastrointestinalen Beschwerden (Erbrechen, Diarrhoe).

Typisch für eine Intoxikation durch Piperazin ist das verzögerte Auftreten der Beschwerden nach etwa 24 Stunden.

Safer Use Regeln

- Falls du keine Möglichkeit hast, Substanzen analysieren zu lassen, teste immer eine halbe Pille an, warte nach der Einnahme 2 Stunden und erfahre die Wirkung.
- Überlege dir gut, ob es wirklich nötig ist, nachzulegen.
- Denk daran: Trink alkoholfreie Getränke (5dl/Stunde), mach von Zeit zu Zeit Pausen an der frischen Luft und vergiss nicht: jede Party hat einmal ein Ende.

