

Warnung: Ecstasy mit TFMPP

Datum: **Februar 2014**

Name	Unbekannt
Gewicht	298.8 mg
Durchmesser	8.0 mm
Dicke	5.2 mm
Bruchrille	Nein
Bemerkungen	Unerkennbares Logo
Farbe	weiss
Inhaltsstoff	TFMPP 178.1 mg / ev. BZP (qual.)
Getestet in	Zürich, Februar 2014



Risikoeinschätzung

Diese Pille enthält das Piperazin TFMPP und kein MDMA. Der Konsum von TFMPP hemmt die Resorption von Alkohol, weshalb es länger dauert, bis man die Wirkung des Alkohols spürt. Verzichte deshalb auf den Mischkonsum mit Alkohol! Kombiniert mit BZP wird vor allem bei hohen Dosierungen eine hohe Dopamin- und Serotoninausschüttung ausgelöst. Dies kann zum Serotoninsyndrom oder anderen gefährlichen Nebenwirkungen führen. Da die Wirkung erst nach 60-90 Minuten einsetzt und sich keine MDMA typische Wirkung einstellt, besteht die Gefahr dass „nachgespickt“ wird, was die Aufnahme einer hohen Dosis TFMPP zur Folge haben kann. Bereits die Pille enthält sehr viel TFMPP. Neben einer Verstärkung der Nebenwirkungen kann es unter Umständen zu einer lebensgefährlichen Atemdepression kommen.

TFMPP (1-(3-Trifluormethylphenyl)-Piperazin

Dosierung: 25mg – max. 100mg (oral)

Wirkungseintritt und -dauer: nach 1-1.5 Std. / 5 – 8 Std.

Wirkung: Die Wirkung von TFMPP ist stark dosisabhängig und liegt zwischen MDMA (Ecstasy) und Meskalin/Pilzen. Niedrig dosiert (25-80mg) ist vor allem eine entaktogene Wirkung (sich öffnend) bemerkbar. Es stellt sich ein erhöhtes Bedürfnis nach sozialen Kontakten ein und das Körperempfinden wird für Berührungen sensibilisiert. In hohen Dosen (ab 80mg) treten LSD ähnliche Halluzinationen auf.

Risiken und Nebenwirkungen: Der Konsum von TFMPP kann Nebeneffekte wie hoher Blutdruck, Herzrasen, Erhöhung der Körpertemperatur, notorische Unruhe usw. zur Folge haben. In hohen Dosen kann es unter Umständen zu einer tödlichen Atemdepression kommen. Der Konsum von TFMPP hemmt die Resorption von Alkohol.

BZP (1-Benzylpiperazin)

BZP ist ein Piperazin und ist auch unter dem Namen A2 bekannt. Die Wirkung ist mit der von Amphetamin vergleichbar.

Dosierung: 50 – 200 mg (oral)

Wirkungseintritt und -dauer: nach ca. 30 min. / 3- 5 Std.

Wirkung: BZP wirkt stimulierend und ist demnach mit Amphetamin vergleichbar. Man wird wach, hat einen erhöhten Bewegungsdrang und man verspürt eine gesteigerte Konzentrationsfähigkeit. Die Wirkung ist aber generell weniger stark und dauert auch weniger lang an.

Risiken und Nebenwirkungen: Es kann zu Herzrasen, erhöhtem Blutdruck, Herz- und Pulsrasen, Übelkeit, Kopfschmerzen usw. kommen. Zudem ist BZP leicht ätzend, weshalb es nach (mehrmaligem) Konsum zu Nierenschmerzen kommen kann.

Safer Use Regeln

- Falls du keine Möglichkeit hast Substanzen analysieren zu lassen, teste immer eine halbe Pille an, warte nach der Einnahme 2 Stunden und erfahre die Wirkung.
- Überlege dir gut, ob es wirklich nötig ist, nachzulegen.
- Denk daran: trinke alkoholfreie Getränke, mache von Zeit zu Zeit Pause an der frischen Luft und vergiss nicht: jede Party hat einmal ein Ende

www.saferparty.ch ein Angebot von Streetwork Zürich + Partner von www.safer-clubbing.ch

