

Info: XTC Pille mit Coffein und MDMA

Neue Pillen: **Februar 2014**



Name	Louis Vitton	Adler
Gewicht	255.3 mg	295.8 mg
Durchmesser	9.1 mm	9.2 mm
Dicke	3.7 mm	3.9 mm
Bruchrille	Ja	Ja
Bemerkungen	-	Geringe Menge MDMA
Farbe	rot	rot
Inhaltsstoff	Coffein 1.8 mg / MDMA 83.8 mg	Coffein 4.2 mg / MDMA 62.8 mg
Getestet in	Zürich, Februar 2014	Zürich, Februar 2014

Risikoeinschätzung MDMA+Coffein

Die Kombination beider Substanzen verstärkt den stimulierenden Effekt sowie die Gefahr der Dehydratation, da Coffein dem Körper zusätzlich Wasser entzieht.

Infos zu Coffein

Coffein ist ein Alkaloid der Kaffeebohnen, Tee- und Mateblättern, Kolanüssen, etc.

Wirkungseintritt und -dauer: nach 10-60 Min. / 2-3 Std.

Wirkung: Coffein macht wach, beschleunigt den Herzschlag und steigert vorübergehend die geistige Leistungsfähigkeit. In höheren Dosen (300-600 mg = ca. 8 Tassen Kaffee) erzeugt er Euphorie.

Nebenwirkungen: Coffein entzieht dem Körper Flüssigkeit (Dehydratation). Bei sehr hohen Dosen können Schweißausbrüche, Herzflattern, Harndrang, Herzrhythmusstörungen, starke Wahrnehmungsstörungen, Zittern, Nervosität und Schlafstörungen aufkommen.

Infos zu MDMA*HCl

Dosierung: max. 1.5 mg MDMA pro kg Körpergewicht für Männer, max. 1.3 mg pro kg Körpergewicht für Frauen. **Wirkungseintritt und -Dauer:** nach ca. 30 Min. / 4-6 Std.

Wirkung: MDMA bewirkt eine vermehrte Freisetzung des Neurotransmitters Serotonin. Hunger- und Durstgefühl werden reduziert, Wachheit und Aufmerksamkeit wird erhöht, Körpertemperatur und Blutdruck steigen an. Auf MDMA fühlst du dich leicht und unbeschwert, ein wohliges Körpergefühl breitet sich aus. Seh- und Hörvermögen verändern sich, Berührungen und Musik werden intensiver empfunden, Hemmungen werden abgebaut und das Kontaktbedürfnis wird gesteigert.

Nebenwirkungen: Kiefermahlen, Muskelzittern, Übelkeit / Brechreiz und erhöhter Blutdruck. Herz, Leber und Nieren werden besonders stark belastet. Es besteht auch die Gefahr eines Hitzeschlags, da die Körpertemperatur erhöht wird.

Safer Use Regeln

- Falls du keine Möglichkeit hast, Substanzen analysieren zu lassen, teste immer eine halbe Pille an, warte nach der Einnahme 2 Stunden und erfahre die Wirkung.
- Überlege dir gut, ob es wirklich nötig ist nachzulegen.
- Denk daran: Trink alkoholfreie Getränke, mach von Zeit zu Zeit Pause an der frischen Luft und vergiss nicht: Jede Party hat einmal ein Ende.

