

Warnung: XTC-Pillen mit MDMA und MDA

Datum: September 2015



Name	Toyota	Toyota	Toyota
Gewicht	319.6 mg	339.5 mg	340.7 mg
Durchmesser	8.6 mm	8.6 mm	8.6 mm
Dicke	3.6 mm	3.9 mm	3.8 mm
Bruchrille	Nein	Nein	Nein
Farbe	Grau	Grau	Grau
Inhaltsstoffe	MDMA 57.8 mg MDA 34.1 mg	MDMA 61.6 mg MDA 37.8 mg	MDMA 67.4 mg MDA 35.4 mg
Getestet in	Basel, September 2015	Zürich, September 2015	Bern, September 2015

Risikoeinschätzung

Diese XTC Pillen enthalten neben MDMA das synthetische Amphetaminderivat MDA. Die Wirkung von MDA ist ähnlich der von MDMA, wird jedoch als härter, stärker und weniger „magisch“ als MDMA empfunden. Zudem ist eine halluzinogene Wirkkomponente möglich. Da diese Tabletten zwei psychoaktive Substanzen enthalten, erhöht sich, infolge des Mischkonsums, die körperliche Belastung (z.B. Herzkreislauf).

Infos zu MDA*HCl

Substanz: 3,4-Methylendioxyamphetamin

Dosierung: vergleichbar mit der von MDMA

Wirkungseintritt und –Dauer: nach ca. 30 Min. / 8-12 Std. (= bedeutend länger als MDMA)

Wirkung: MDA ist vergleichbar mit der von MDMA, wird aber allgemein als „kälter“ beschrieben. Die Unterschiede liegen in der Dauer und Intensität. Das Glücksgefühl (Magic-Feeling) ist weniger ausgeprägt als bei MDMA, dafür weist MDA eine leicht halluzinogene Wirkung auf.

Nebenwirkungen: Kiefermahlen, Muskelzittern, Übelkeit / Brechreiz und erhöhter Blutdruck können wie bei MDMA auftreten. MDA ist sowohl neurotoxisch (hirnschädigend) wie auch hepatotoxisch (leberschädigend). Bei längerer Einnahme von MDA, je nach psychischer Voraussetzung (Vulnerabilität) könnten schizophrenie-ähnliche Symptome auftreten.

Infos zu MDMA*HCl

Substanz: 3,4-Methylendioxy-N-methylamphetamin

Dosierung: Max. 1.5 mg MDMA pro kg Körpergewicht für Männer, max. 1.3 mg pro kg Körpergewicht für Frauen. **Wirkungseintritt / -dauer:** Nach ca. 30 Min. / 4-6 Std.

Wirkung: MDMA bewirkt hauptsächlich eine vermehrte Freisetzung des körpereigenen Botenstoffs Serotonin. Diese Ausschüttung löst ein Gefühl der Euphorie, Leichtigkeit und der Unbeschwertheit aus. Seh- und Hörvermögen verändern sich, Berührungen und Musik werden intensiver empfunden, Hemmungen werden abgebaut und das Kontaktbedürfnis wird gesteigert. Hunger- und Durstgefühl sowie Müdigkeit werden reduziert, die Aufmerksamkeit wird erhöht. Auch die Körpertemperatur und der Blutdruck steigen an.



Warnung: XTC-Pillen mit MDMA und MDA

Nebenwirkungen: Kiefernahlen, Muskelzittern, Übelkeit / Brechreiz und erhöhter Blutdruck. Herz, Leber und Nieren werden besonders stark belastet. Es besteht die Gefahr des Austrocknens oder gar des Hitzeschlags, da die Körpertemperatur ansteigt.

Safer Use Regeln

- Falls du keine Möglichkeit hast, Substanzen analysieren zu lassen, teste immer eine halbe Pille an, warte nach der Einnahme 2 Stunden und erfahre die Wirkung.
- Überlege dir gut, ob es wirklich nötig ist, nachzulegen.
- Denk daran: Trink alkoholfreie Getränke (5dl/Stunde), mach von Zeit zu Zeit Pausen an der frischen Luft und vergiss nicht: jede Party hat einmal ein Ende.

