

Vorsicht: verkauft als XTC's

Datum: Dezember 2014

Name	Herz
Gewicht	149.1 mg
Durchmesser	7.1 x 7.1 mm
Dicke	3.1 mm
Bruchrille	Ja
Farbe	Hellblau
Inhaltsstoffe	Metandienon Methyltestosteron
Bemerkung	Pille ist bedeutend kleiner und leichter als eine typische XTC Tablette
Getestet in	Bern, Dezember 2014



Risikoeinschätzung

Diese als XTC verkauften Pille beinhaltet kein MDMA, sondern die beiden anabolen Steroide Metandienon und Methyltestosteron. Das Risiko liegt dabei vor allem beim regelmässigen Konsum, beide Substanzen können Leberschäden hervorrufen. Es können leicht stimulierende Effekte und ein Gefühl von Stärke auftreten, weitere psychoaktive Wirkungen stellen sich aber nicht ein.

Infos zu Metandienon (Methandrostenolon)

Substanz: 17 β -Hydroxy-17 α -methylandrosta-1,4-dien-3-on

Wirkung: Kurzzeitiges Gefühl von Kraft und Stärke, leicht stimulierender Effekt.

Risiken/Nebenwirkungen: Neben der anabolen Wirkung treten als Nebenwirkungen Bluthochdruck, Akne, Alopezie (Haarausfall auf dem Kopf), Zunahme des Unterhautfettgewebes, Wassereinlagerung im Gewebe auf und es kann zu einer Ausbildung einer weiblichen Brust beim Mann kommen. Bei Männern kommt es insbesondere zu einer Beeinträchtigung der Hormon- und Spermienproduktion und in der Folge zu vorübergehender Unfruchtbarkeit. Bei längerer Anwendung von Metandienon ist eine Leberschädigung zu erwarten.

Infos zu Methyltestosteron (M1T)

Substanz: 17 α -Methyl-4-androsten-17 β -ol-3-on

Wirkung: Methyltestosteron ist ein synthetisch hergestellter Arzneistoff aus der Gruppe der anabolen Steroide und ist ein Abkömmling (Derivat) des physiologisch vorkommenden Sexualhormons Testosteron. Methyltestosteron gehört zu den einzigen oral wirksamen Testosteronwirkstoffen. Heutzutage findet das Methyltestosteron im Bodybuilding nur noch sehr selten Beachtung. Da oral verabreichtes Testosteron während dem First-Pass-Effekt in der Leber quasi vollständig inaktiviert, d.h. zerstört wird. Vor allem bei sublingualer Einnahme (im Mund/auf der Zunge) stellen sich ein leicht stimulierender Effekt ein und der Schmerz wird runtergesetzt.

Nebenwirkungen: fettige Haut, Akne, Haarwuchs am Körper und Kopfharausfall, treten zumeist schon relativ kurz nach dem Einnahmebeginn auf.

Safer Use Regeln

- Falls du keine Möglichkeit hast, Substanzen analysieren zu lassen, teste immer eine halbe Pille an, warte nach der Einnahme 2 Stunden und erfahre die Wirkung.
- Überlege dir gut, ob es wirklich nötig ist, nachzulegen.
- Denk daran: Trink alkoholfreie Getränke (5dl/Stunde), mach von Zeit zu Zeit Pausen an der frischen Luft und vergiss nicht: jede Party hat einmal ein Ende.

