

**AKTUELLES DRUG CHECKING ERGEBNIS AUS INNSBRUCK:****Hochdosierter LSD-Trip**

Februar 2016

**Als LSD zur Analyse gebracht:**

Tatsächliche Inhaltsstoffe:

**LSD (Lysergsäurediethylamid) –  
166 µg (Mikrogramm) / Trip**

Darreichungsform: Trip

Farbe: blau/schwarz/weiß

Logo: Fairtrade



Filze oder Trips mit **über 150 µg LSD** werden als **sehr hoch dosiert** eingestuft. Hohe Dosen erhöhen das Risiko selbst für erfahrene Konsumenten. Eine solch hohe Dosis kann **höchst intensive psychedelische Erlebnisse hervorrufen, welche verstörend und angsteinflößend** sein können. Auch paranoide Vorstellungen können vorkommen. Des Weiteren kann eine Übersensibilität auftreten. Musik, Licht und andere Reize können dabei als extrem unangenehm empfunden werden. Auch eine **Körper-Geist-Trennung (Loslösung vom Körper)** kann auftreten.

**LSD:**

**Dosierung:** 20 bis 75µg werden als leicht, 75 bis 150 µg werden als stark und über 150 µg werden als sehr stark bezeichnet.

**Wirkungseintritt und –Dauer:** nach ca. 20 Min. / 6 bis 11 Std.

**Wirkung:** Die LSD-Wirkung ist sehr stark von **Dosis, Set und Setting** abhängig. LSD intensiviert und verfremdet deine Sinneswahrnehmungen, real existierende Dinge werden anders wahrgenommen und dein Raum-Zeit-Empfinden verändert sich stark. Stimmung und Gefühle können sich abrupt verändern. Dabei können „kreative Gedanken“, neue Ideen oder spirituelle Erfahrungen entstehen.

**Nebenwirkungen:** Besonders in der Anfangsphase des Trips können leichte Atembeschwerden, Herzrasen, Schweißausbrüche, veränderter Blutdruck und Übelkeit auftreten. Die Körpertemperatur erhöht sich leicht, die Pupillen werden erweitert und die optische Fokussierung erschwert. Die Risiken im psychischen Bereich sind von der Persönlichkeitsstruktur abhängig. Die Wahrnehmungsveränderungen können so intensiv sein, dass UserInnen sich von der **Flut von Eindrücken überfordert fühlen. Vor allem bei Nichtbeachtung der Regeln betreffend Set und Setting kann es zu Fehlreaktionen, Orientierungsverlust, Panik, Paranoia und "Horrortrips" kommen.**

**Langzeitrisiken:** Es besteht – auch bei einmaligem Konsum – die Gefahr, dass latente (verborgene) **psychische Störungen** ausgelöst werden können.

**Beachte die Safer Use Regeln!!** (<http://www.drogenarbeitz6.at/substanzen/safer-use.html>)

- Lass deinen Trip unbedingt testen. Falls du keine Möglichkeit hast dein LSD analysieren zu lassen nimm max. die Hälfte und warte mind. 2 Stunden, um die Wirkung zu erfahren.
- Verzichte auf Mischkonsum (auch mit Alkohol, Energydrinks oder Cannabis), da es zu unberechenbaren Wechselwirkungen kommen kann.
- Achte auf die Bedürfnisse deines Körpers: Trink' Wasser & mach' Pausen an der frischen Luft.

Quellen: [www.checkyourdrugs.at](http://www.checkyourdrugs.at), [www.saferparty.ch](http://www.saferparty.ch), [www.erowid.org](http://www.erowid.org)