

Warnung: NBOMe verkauft als LSD

Name	Unbekannt
Farbe	Blau/Grün/Gelb
Inhaltsstoffe	25C-NBOMe*HCl: 995 µg 25B-NBOMe*HCl: 523 µg (von 1/8 hochgerechnet)
Bemerkungen	Bitterer Geschmack im Unterschied zu LSD!
Getestet in	Zürich (Mobil), 28. Oktober 2017



Risikoeinschätzung

Dieser Filz enthält kein LSD, sondern eine **extrem hohe Dosis 25C-NBOMe** und **25B-NBOMe**! Diese beiden Substanzen können zu peripheren Blutgefäßverengungen führen und stehen im Zusammenhang mit einigen Todesfällen in Europa. Besonders bedenklich ist, dass die Aufnahme und der Abbau dieser Substanzen von Person zu Person sehr unterschiedlich ausfallen können. Beide Substanzen wirken direkter und schneller, wenn sie sublingual (unter der Zunge) über die Schleimhäute aufgenommen werden. Wenn die Substanzen oral (geschluckt) eingenommen werden, kann es zu einer schwächeren und/oder zeitlich verzögerten Wirkung kommen. Dadurch besteht die Gefahr, dass nachdosiert und ungewollt überdosiert wird. Aufgrund der schwierigen Handhabung und auch da die Substanzen kaum erforscht sind, raten wir vom Konsum ab!

Infos zu 25C-NBOMe und 25B-NBOMe

Substanz: 25C-NBOMe gehört zur Stoffgruppe der Phenethylamine.

Dosis: bis 500 µg, Dosen ab 500 µg werden als sehr stark bezeichnet.

Wirkungseintritt / Wirkdauer: sublingual nach ca. 0 bis 90(!) Min. / sublingual 6-8 Std.

Substanz: 25B-NBOMe gehört zur Stoffgruppe der Phenethylamine.

Dosis: bis 700 µg, Dosen ab 800 µg werden als sehr stark bezeichnet.

Wirkungseintritt / Wirkdauer: sublingual nach ca. 15 bis 120(!) Min. / sublingual 6-10 Std.

Wirkung: Typisch für NBOMe-Trips sind eine verstärkte Wahrnehmung der Verdauung und des Darms (gastrointestinales Gefühl), sowie ein stark sensibilisiertes Tastgefühl. Die Wirkung ist eher mental und weniger visuell. Gemäss User-Berichten wirken 25C-NBOMe und 25B-NBOMe von Mal zu Mal unterschiedlich, weshalb sich die Wirkung schlecht voraussagen lässt. Der Konsum führt nicht zu Appetitlosigkeit, einem trockenen Mund oder seltsamen Geschmacksinn und unterscheidet sich dadurch deutlich von LSD, DOI und 2C-B/I. **Risiken:** Verschiedene Meldungen weisen darauf hin, dass es zu einer peripheren Blutgefäßverengung kommen kann, welche medizinisch behandelt werden muss. Symptome sind Kälte, Blauanlaufen und Taubheitsgefühle an den Extremitäten (Gliedmassen). Das Taubheitsgefühl kann bis zu einer Woche nach dem Konsum anhalten. Der Konsum kann auch zu Schwellung an Händen, Füßen oder Gesicht führen. Aufgrund der komplexen Substanzaufnahme sollte bei 25C-NBOMe und 25B-NBOMe nie nachdosiert werden.

Safer Use Regeln

- Falls du keine Möglichkeit hast, Substanzen analysieren zu lassen, teste einen halben Filz an und warte mindestens zwei Stunden bis die Wirkung sich voll entfaltet hat.
- Aufgrund der komplexen Substanzaufnahme, des unterschiedlichen Wirkungseintrittes und der unterschiedlichen Wirkungsentfaltung soll bei 25C-NBOMe und 25B-NBOMe nie nachdosiert werden.
- Denk daran: Trink alkoholfreie Getränke (5dl/Stunde), mach von Zeit zu Zeit Pausen an der frischen Luft und vergiss nicht: jede Party / jeder Trip hat einmal ein Ende.