

Warnung: 2C-P verkauft als 2C-B

Getestet in Zürich (DIZ), 02. März 2018



Eine als 2C-B deklarierte Probe enthielt kein 2C-B, sondern die verwandte Substanz 2C-P.

2C-P (4-propyl-2,5-dimethoxyphenethylamine) ist ein synthetisches Halluzinogen, welches ähnlich wirkt wie 2C-B, jedoch tiefer dosiert wird und eine längere Wirkdauer aufweist. Bei einer Falschdeklaration als 2C-B kann es aufgrund des späten Wirkungseintrittes und der unterschiedlichen (tieferen) Dosierung schnell zu Überdosierungen und dadurch zu einer psychischen Überforderung kommen. Die Wirkung von 2C-P ist eher mit der von 2C-E vergleichbar, wird allerdings als visueller und intensiver beschrieben.

Da der Konsum von 2C-P sehr selten ist, können kaum definitive Aussagen zur Wirkung gemacht werden. User/innen berichten jedoch von einer schwierigen Handhabung; vor allem wenn 2C-P in hohen Dosen eingenommen wird. Einige Personen berichten von ausserkörperlichen, verwirrenden, traumähnlichen Erfahrungen, sowie starken visuellen und das Gehör betreffenden Halluzinationen. Als Nebenwirkungen können unter anderem Kopfschmerzen, Angst, Paranoia, Verwirrung, tiefer Blutdruck und Krämpfe auftreten.

Dosierung 2C-B: geschnupft 2 bis max. 15 mg, geschluckt 5 bis max. 45 mg (Dosen ab 10 mg werden als stark bezeichnet)

Dosierung 2C-P: geschnupft 0.5 bis max. 12 mg, geschluckt 1 bis max. 16 mg (Dosen ab 8 mg werden als stark bezeichnet)

Wirkdauer 2C-B: 4-8 Stunden

Wirkdauer 2C-P: 10-20 Stunden

Wichtig zu wissen ist, dass 2C-P seine Wirkung oftmals erst nach 2-3 Stunden entfaltet.

Auch bei Pulvern und kristallinen Proben kommt es immer wieder zu Falschdeklarationen; auch diese deshalb unbedingt vor dem Konsum testen lassen!

Safer Use Regeln

- Falls du keine Möglichkeit hast, Substanzen analysieren zu lassen, teste immer eine kleine Menge an, um Überdosierungen zu vermeiden.
- Warte nach oraler Einnahme 2 Stunden, da immer wieder Pulver / Kristalle mit unerwarteten Wirkstoffen im Umlauf sind, welche einen späteren Wirkungseintritt haben können.
- Verwende bei einer nasalen Applikation (sniffen) von Pulvern immer deine eigenen Sniffutensilien, um dich oder andere nicht mit Krankheiten anzustecken.