

Vorsicht: 2C-E verkauft als 2C-B

Logo	Kein Logo
Gewicht	93.3 mg
Durchmesser	6.7 mm
Dicke	3.6 mm
Bruchrille	Nein
Farbe	Weiss
Inhaltsstoffe	2C-E*HCl: 7.5 mg
Getestet in	Bern (DIB), 13. Mai 2020



Risikoeinschätzung

Diese als 2C-B verkaufte Tablette enthielt kein 2C-B, sondern **7.5 mg 2C-E**. 2C-E ist nahe verwandt mit 2C-B und wirkt ähnlich wie dieses. 2C-E ist ein psychedelisches Phenethylamin-Derivat, welches bereits in kleinen Mengen psychoaktiv wirkt, wobei 2 mg mehr oder weniger einen grossen Unterschied bewirken können. Im Unterschied zu 2C-B hat 2C-E eine etwas längere Wirkdauer (bis zu 9 Stunden). 2C-E steht im Verdacht im Zusammenhang mit mehreren Hospitalisationen zu stehen.

Zusätzlich enthält diese Tablette ca. 0.1 mg einer strukturverwandten Syntheseverunreinigung. Es liegen keine Informationen betreffend Toxizität dieser Verunreinigung vor.

Infos zu 2C-E*HCl

Substanz: 2C-E (2,5-Dimethoxy-4-ethylphenethylamin).

Dosierung: Geschluckt 5 bis 25 mg. 2C-B wirkt schon in kleinen Mengen; 2 mg mehr oder weniger haben einen grossen Einfluss auf die Wirkung. **Dosiere vorsichtig!**

Wirkungseintritt / Wirkdauer: Nach ca. 20-90 Min. / ca. 4-9 Std.

Wirkung Wahrnehmungen und Gefühle werden intensiviert und eine leichte Euphorie kann sich einstellen. Ab 10-15 mg erhält die Wirkung einen halluzinogenen Charakter. Grenzen zwischen Innen und Aussen lösen sich auf. Farbige Muster, leuchtende Felder um Personen und Gegenstände werden wahrgenommen. Mit Musik kann es zu einer Kopplung zwischen dem Gehörten und dem Gesehenen kommen (Synästhesie). Der Rausch dauert weniger lang und wird als weniger tief empfunden als bei LSD, Psilocybin oder Meskalin.

Nebenwirkungen Die Pupillen weiten sich, der Blutdruck steigt an und es kann zu Übelkeit, Schweissausbrüchen und Schwindelanfällen kommen. Magen- und Darmbeschwerden und leichte allergische Reaktionen, sowie Husten aufgrund vermehrter Schleimproduktion treten vereinzelt auf. Orientierungslosigkeit, Verwirrung und Angstgefühle bis hin zu Panik sind Risiken, welche auf psychischer Ebene auftreten können. Der Konsum kann latente (verborgene) psychische Störungen zum Vorschein treten lassen! Körperliche Langzeitriskien sind nicht erforscht.

Safer-Use Regeln

- Falls du keine Möglichkeit hast Substanzen analysieren zu lassen, teste zuerst maximal eine drittel Pille an, da sehr viele hochdosierte Tabletten im Umlauf sind.
- Warte nach der Einnahme 2 Stunden, da immer wieder auch Tabletten mit unerwarteten Wirkstoffen im Umlauf sind, welche einen späteren Wirkungseintritt haben können.
- Achte auf Set und Setting, konsumiere nur an Orten, an welchen du dich wohl fühlst und vermeide Mischkonsum.